



ACTIVITATS

TESIS

GRUPS DE RECERCA

ENTREVISTES

AVENÇOS

A FONS

## PSICOLOGIA



## AVENÇOS

**L'atenció de les rates cap a les seves cries les protegeix contra l'estrès quan són adultes**

Un estudi amb rates mostra que davant d'una situació d'estrès ambiental, la mare augmenta la seva conducta materna cap a les cries. Quan són adultes, aquestes cries tenen una menor reactivitat endocrina a l'estrès i afronten més activament noves situacions estressants. Els resultats mostren diferències entre mascles i femelles i segons les situacions.

[+]

## AVENÇOS

**Natura dinàmica i imbricada de la cognició sensoriomotriu**

La neurociència experimental està aportant cada vegada més dades sobre la imbricació dels processos sensorials i els motrius, i cada vegada més neurocientífics consideren que el cervell s'ha d'entendre com un sistema obert en contínua interacció amb l'entorn. Aquest article proposa un model dinàmic en què l'output és un esdeveniment que respon a l'esdeveniment precedent com a input.

[+]

## TESIS

**Normalització del consum de drogues en els darrers vint anys**

Una tesi doctoral descriu el procés de normalització dels consums de drogues esdevingut en els darrers anys i analitza com la immensa majoria de consumidors controla els efectes indesitjats de les drogues i es manté normalitzada socialment. La tesi evidencia que el principal focus dels problemes relacionats amb les drogues són producte de les polítiques prohibicionistes.

[+]

## AVENÇOS

**Detectats factors de risc comuns en infra-pes i obesitat**

Els trastorns alimentaris afecten múltiples aspectes de la salut de les persones que els pateixen. Una recerca en què han participat investigadores de la UAB ha inclòs pacients amb baix pes i amb obesitat, per tal de comparar i detectar factors de risc comuns en l'origen i el desenvolupament d'aquestes alteracions. Els resultats mostren aspectes comuns en ambdós grups.

[+]

05/2014 - **És acceptable posar fi a la vida d'un pacient?**

**A Espanya, Portugal i França està prohibit per llei posar fi a la vida d'un pacient. Tot i això, diversos estudis han demostrat que moltes persones creuen que hauria d'estar permès en determinades circumstàncies. Un nou estudi mostra que el tipus de procediment mitjançant el qual es posaria fi a la vida d'un pacient és el factor fonamental a l'hora de jutjar la seva acceptabilitat. Les actituds dels participants de l'estudi són similars als tres països, tot i que els espanyols mostren més acceptació.**

## Referències

Mullet, E.; Neto, F.; Pinto, C.; Raich, R.M.; Munoz-Sastre, T.; Solum, P. *The Acceptability of Ending a Patient's Life: A France-Portugal-Spain Comparison*. *Death Studies* 38(1): 28-35. DOI: 10.1080/07481187.2012.712607.

Aquest estudi va comparar les opinions de francesos, portuguesos i espanyols en l'acceptabilitat de la decisió de posar fi a la vida d'un pacient i dels factors que poden afectar aquesta decisió.

En aquests països europeus, acabar amb la vida d'un pacient està prohibit per la llei (per exemple a França, "Loi relative aux droits des malades et a la fin de vie", 2005; Pro-Con.org, 2010), però un gran nombre d'estudis mostra que moltes persones creuen que en determinades circumstàncies hauria d'estar permès. Per exemple, el 1999 es va portar a terme un estudi en 33 països europeus (Cohen et al., 2006a). En base a les respostes sobre l'acceptabilitat de l'eutanàsia els països es van repartir en tres posicions: aquells pels quals era relativament acceptable (França o Bèlgica) i aquells pels quals era poc acceptable (Gran Bretanya o Espanya) i inacceptable (com Portugal).

En l'estudi que es presenta 277 adults de Barcelona, Porto i Tolosa van jutjar l'acceptabilitat dels procediments de fi de vida en 42 escenaris compostos per totes les combinacions de tres factors: edat del pacient (30 o 80 anys), esperança de vida del pacient (en dies, setmanes o mesos) i el tipus de procediment (el suïcidi, el suïcidi assistit pel metge, l'eutanàsia per part del metge a petició d'un pacient que sofreix, l'eutanàsia d'un pacient en estat de coma a petició de la família, l'eutanàsia d'un pacient en estat de coma, estipulat en directives donades anteriorment pel pacient, l'eutanàsia d'un pacient en estat de coma sense que existissin directives donades per ell mateix i sense una petició de la família, o l'eutanàsia d'un pacient amb sofriment però sense una petició del pacient).

En els tres països, el tipus de procediment va ser considerat important. Els quatre procediments implementats pel pacient o per petició del pacient van ser, en mitjana, considerats acceptables. Els dos procediments no sol·licitats pels pacients van ser considerats inacceptables. L'eutanàsia d'un pacient en estat de coma a petició de la família va ser jutjada mitjanament acceptable.

Les actituds de les persones a Tolosa, Porto i Barcelona sobre l'acceptabilitat d'acabar amb la vida d'un pacient ara han convergit en gran part, tot i que els participants espanyols van mostrar estadísticament i significativa més acceptació que els participants francesos i portuguesos. S'especula sobre la influència del cas Sampedro en el canvi d'opinió dels espanyols.

Rosa Maria Raich

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Rosa.Raich@uab.cat

